



2014年 登録件数内訳



| 部位 | ICDコード | 総数 | % | 男性 | % | 女性 | % |
|------------|-----------------|-------|--------|-------|--------|-----|--------|
| 口腔・咽頭・喉頭 | C00-C14、 | 101 | 4.5% | 85 | 6.7% | 16 | 1.6% |
| 食道 | C15 | 36 | 1.6% | 33 | 2.6% | 3 | 0.3% |
| 胃 | C16 | 204 | 9.0% | 147 | 11.5% | 57 | 5.8% |
| 大腸 | C18-C20 | 288 | 12.7% | 182 | 14.3% | 106 | 10.7% |
| (結腸) | C18 | 195 | 8.3% | 115 | 8.6% | 80 | 7.9% |
| (直腸) | C19-C20 | 93 | 4.6% | 67 | 5.4% | 26 | 3.5% |
| 肝臓 | C22 | 61 | 2.7% | 44 | 3.4% | 17 | 1.7% |
| 胆嚢・胆管 | C23-C24 | 26 | 1.1% | 14 | 1.1% | 12 | 1.2% |
| 膵臓 | C25 | 35 | 1.5% | 21 | 1.6% | 14 | 1.4% |
| 肺 | C34 | 232 | 10.3% | 166 | 13.0% | 66 | 6.7% |
| 骨・軟部組織 | C40-41、C | 6 | 0.3% | 4 | 0.3% | 2 | 0.2% |
| 皮膚(黒色腫を含む) | C44 | 104 | 4.6% | 45 | 3.5% | 59 | 6.0% |
| 乳房 | C50 | 294 | 13.0% | 1 | 0.1% | 293 | 29.7% |
| 子宮 | | 69 | 3.0% | - | - | 69 | 7.0% |
| (子宮頸部) | C53 | 44 | 1.7% | - | - | 44 | 1.7% |
| (子宮体部) | C54 | 25 | 1.9% | - | - | 25 | 1.9% |
| 卵巣 | C56 | 29 | 1.3% | - | - | 29 | 2.9% |
| 前立腺 | C61 | 184 | 8.1% | 184 | 14.4% | - | - |
| 精巣 | C62 | 16 | 0.7% | 16 | 1.3% | - | - |
| 膀胱 | C67 | 86 | 3.8% | 72 | 5.6% | 14 | 1.4% |
| 腎・他の尿路 | C64-C66、 | 64 | 2.8% | 47 | 3.7% | 17 | 1.7% |
| 脳・中枢神経 | C700、C7 | 75 | 3.3% | 34 | 2.7% | 41 | 4.2% |
| 甲状腺 | C73 | 88 | 3.9% | 18 | 1.4% | 70 | 7.1% |
| 悪性リンパ腫 | 959-972、974-975 | 111 | 4.9% | 61 | 4.8% | 50 | 5.1% |
| 多発性骨髄腫 | 973、966 | 28 | 1.2% | 16 | 1.3% | 12 | 1.2% |
| 白血病 | 980-994 | 28 | 1.2% | 19 | 1.5% | 9 | 0.9% |
| その他造血器 | 995-998 | 39 | 1.7% | 30 | 2.4% | 9 | 0.9% |
| その他 | | 59 | 2.6% | 37 | 2.9% | 22 | 2.2% |
| | | 2,263 | 100.0% | 1,276 | 100.0% | 987 | 100.0% |



年齢・性別による登録総件数




主要5部位 年齢・性別登録件数（癌種のみ）




肝

件




肺

件




乳腺



| | 4-5歲 | 5-9歲 | 10-14歲 | 15-19歲 | 20-24歲 | 25-29歲 | 30-34歲 | 35-39歲 | 40-44歲 | 45-49歲 | 50-54歲 | 55-59歲 | 60-64歲 | 65-69歲 | 70-74歲 | 75-79歲 | 80-84歲 | 85-89歲 | 90歲以上 |
|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| ■ 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 22 | 35 | 34 | 35 | 29 | 40 | 43 | 27 | 8 | 5 | 2 |
| ■ 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

主要5部位・症例区分別（癌腫のみ）


| | (件) | | | | |
|-------------|-----|-----|----|-----|-----|
| | 胃 | 大腸 | 肝 | 肺 | 乳腺 |
| 診断のみ | 18 | 13 | 6 | 47 | 14 |
| 自施設診断・自施設治療 | 91 | 178 | 38 | 157 | 137 |
| 他施設診断・自施設治療 | 86 | 75 | 15 | 22 | 39 |
| 他施設初回治療開始後 | 9 | 22 | 2 | 5 | 104 |
| 剖検のみ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 204 | 288 | 61 | 232 | 294 |



主要5部位 治療前ステージ別件数

※ 自施設で診断または、初回治療を行った症例(経過観察を含む)を対象とする。

| | (件) | | | | | |
|----|-----|----|-----|------|-----|----|
| | 0期 | I期 | II期 | III期 | IV期 | 不明 |
| 胃 | 0 | 90 | 17 | 19 | 29 | 20 |
| 大腸 | 10 | 42 | 47 | 60 | 37 | 57 |
| 肝 | 0 | 21 | 9 | 13 | 7 | 2 |
| 肺 | 0 | 41 | 16 | 34 | 79 | 9 |
| 乳腺 | 24 | 64 | 61 | 11 | 8 | 6 |




治療前ステージ別にみた治療方法の割合

胃

※ 自施設で治療を行った症例(経過観察を含む)を対象とする。

| 治療前ステージ 全体(175件) | I 期 90 (100%) | II 期 17 (100%) | III 期 19 (100%) | IV 期 29 (100%) | 不明 20 (100%) |
|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 手術のみ | 14.4 | 29.4 | 26.3 | 3.4 | 5.0 |
| 体腔鏡のみ | 21.1 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 10.0 |
| 内視鏡のみ | 48.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 |
| 手術・体腔鏡＋内視鏡 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 薬物療法のみ | 1.1 | 0.0 | 5.3 | 62.1 | 0.0 |
| 手術・体腔鏡・内視鏡＋薬物 | 8.9 | 64.7 | 57.9 | 17.2 | 0.0 |
| 治療なし | 3.3 | 5.9 | 5.3 | 17.2 | 30.0 |

%




治療前ステージ別にみた治療方法の割合

大腸

※ 自施設で治療を行った症例(経過観察を含む)を対象とする。

| 治療前ステージ 全体(253件) | 0期 10 (100%) | I期 42 (100%) | II期 47 (100%) | III期 60 (100%) | IV期 37 (100%) | 不明 57 (100%) |
|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 手術のみ | 10.0 | 28.6 | 17.0 | 16.7 | 21.6 | 8.8 |
| 体腔鏡のみ | 20.0 | 52.4 | 42.6 | 25.0 | 13.5 | 5.3 |
| 内視鏡のみ | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 77.2 |
| 手術・体腔鏡＋内視鏡 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| 薬物療法のみ | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 1.7 | 10.8 | 0.0 |
| 放射線＋薬物 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 手術・体腔鏡・内視鏡＋薬物 | 0.0 | 11.9 | 36.2 | 50.0 | 40.5 | 1.8 |
| 手術・体腔鏡・内視鏡＋放射線＋薬物 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 1.7 | 2.7 | 0.0 |
| 他の組み合わせ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 |
| 治療なし | 10.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 5.3 |




治療前ステージ別にみた治療方法の割合

肺

※ 自施設で治療を行った症例(経過観察を含む)を対象とする。

| 治療前ステージ 全体(179件) | 0期 0 (100%) | I期 41 (100%) | II期 16 (100%) | III期 34 (100%) | IV期 79 (100%) | 不明 9 (100%) |
|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 手術のみ | 0.0 | 26.8 | 25.0 | 0.0 | 1.3 | 11.1 |
| 体腔鏡のみ | 0.0 | 43.9 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 66.7 |
| 放射線のみ | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 2.9 | 6.3 | 0.0 |
| 薬物療法のみ | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 61.8 | 51.9 | 0.0 |
| 放射線+薬物 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 6.3 | 0.0 |
| 手術・体腔鏡・内視鏡+薬物 | 0.0 | 17.1 | 18.8 | 5.9 | 2.5 | 0.0 |
| 手術・体腔鏡・内視鏡+放射線+薬物 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 |
| その他の組み合わせ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
| 治療なし | 0.0 | 12.2 | 6.3 | 11.8 | 27.8 | 22.2 |



治療前ステージ別にみた治療方法の割合

乳腺

※ 自施設で治療を行った症例(経過観察を含む)を対象とする。

| 治療前ステージ 全体(174件) | 0期 24 (100%) | I期 64 (100%) | II期 61 (100%) | III期 11 (100%) | IV期 8 (100%) | 不明 6 (100%) |
|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 手術のみ | 20.8 | 4.7 | 3.3 | 9.1 | 0.0 | 0.0 |
| 薬物療法のみ | 0.0 | 3.1 | 21.3 | 54.5 | 62.5 | 0.0 |
| 放射線+薬物 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 手術・体腔鏡・内視鏡+放射線 | 33.3 | 14.1 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
| 手術・体腔鏡・内視鏡+薬物 | 29.2 | 34.4 | 57.4 | 36.4 | 12.5 | 33.3 |
| 手術・体腔鏡・内視鏡+放射線+薬物 | 16.7 | 42.2 | 14.8 | 0.0 | 12.5 | 33.3 |
| 治療なし | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 |

%

