

レジメン名称:AC療法(ドキシソルビシン+シクロホスファミド)

診療科 : 外科

適応症 : 術前・術後 乳がん、進行・再発乳がん

1コース : 21日間

総コース数 : 術前・術後 4

進行・再発 PDとなるまで

外科・乳がん-1-3-01

外科・乳がん-1-3-20

RP	医薬品名(商品名)・(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	day(1)	備考
1	生理食塩液[100mL/瓶] ホスアプレピタント点滴静注用150mg	100 mL 150mg	点滴末梢	メイン	30分	○	
2	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL デキサート注射液(6.6mg/2mL)	50 mL 6.6mg	点滴末梢	メイン	30分	○	
3	生理食塩液[50mL/瓶] ドキシソルビシン塩酸塩注射用	50 mL 60mg/m ²	点滴末梢	メイン	全開	○	ドキシソルビシン 累積投与:500mg・m ²
4	生理食塩液[100mL/瓶] エンドキサン注射用	100 mL 600mg/m ²	点滴末梢	メイン	30分	○	
5	生理食塩液[50mL/瓶]	50 mL	点滴末梢	メイン	フラッシュ	○	