

レジメン名称: weekly Tmab+PTX療法

外科・乳がん-1-3-07

診療科 : 外科

適応症 : 術前・術後 乳がん

1コース : 7日間

総コース数 : 併用12サイクル
(その後Tmab単剤で40サイクル)

引用文献:

RP	医薬品名(商品名)・(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	day(1)	備考
1	生理食塩液[100mL/瓶] デキサート注射液(3.3mg/1mL) デキサート注射液(6.6mg/2mL) ポララミン注(5mg/1mL) ファモチジン注射液(20mg/2mL)	100 mL 3.3mg 6.6mg 5mg 20mg	点滴末梢	メイン	30分	○	
2	生理食塩液[250mL/瓶] バクリタキセル点滴静注液	250 mL 80mg/m ²	点滴末梢	メイン	60分	○	
3	生理食塩液[250mL/瓶] 注射用水[20mL/A] トラスツズマブ静注用	250 mL 20mL 初回: 4mg/kg 2回目以降: 2mg/kg	点滴末梢	メイン	初回: 90分 2回目~: 30分	○	
4	生理食塩液[50mL/瓶]	50 mL	点滴末梢	メイン	フラッシュ	○	

併用後のトラスツズマブ単剤

1	生理食塩液[50mL/瓶]	50 mL	点滴末梢	メイン	キープ用	○	
2	生理食塩液[250mL/瓶] 注射用水[20mL/A] トラスツズマブ静注用	250 mL 20mL 初回: 4mg/kg 2回目以降: 2mg/kg	点滴末梢	メイン	初回: 90分 2回目~: 60分	○	
3	生理食塩液[50mL/瓶]	50 mL	点滴末梢	メイン	フラッシュ	○	