

レジメン名称: 3weekly Tmab+PTX療法

外科・乳がん-1-3-09

診療科 : 外科

適応症 : 術前・術後 乳がん

1コース : 21日間

総コース数 : 併用4サイクル

(その後Tmab単剤で14サイクル)

引用文献:

| RP | 医薬品名(商品名)・(規格) | 投与量 | 手技 | ルート | 投与時間 | day(1) | 備考 |
|----|--|---|------|-----|----------------------|--------|----|
| 1 | 生理食塩液[100mL/瓶] デキサート注射液(6.6mg/2mL) デキサート注射液(3.3mg/0.5mL) ポララミン注(5mg/1mL) ファモチジン注射液(20mg/2mL) | 100 mL 13.2mg 3.3mg 5mg 20mg | 点滴末梢 | メイン | 30分 | ○ | |
| 2 | 生理食塩液[500mL/瓶] パクリタキセル点滴静注液 | 500 mL 175mg/m ² | 点滴末梢 | メイン | 3時間 | ○ | |
| 3 | 生理食塩液[250mL/瓶] 注射用水[20mL/A] トラスツズマブ静注用 | 250 mL 20mL 初回: 8mg/kg 2回目以降: 6mg/kg | 点滴末梢 | メイン | 初回: 90分 2回目~: 30分 | ○ | |
| 4 | 生理食塩液[50mL/瓶] | 50 mL | 点滴末梢 | メイン | フラッシュ | ○ | |