

レジメン名称: 3weekly Tmab+PTX療法

外科・乳がん-1-3-09

診療科 : 外科

適応症 : 術前・術後 乳がん

1コース : 21日間

総コース数 : 併用4サイクル

(その後Tmab単剤で14サイクル)

引用文献:

RP	医薬品名(商品名)・(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	day(1)	備考
1	生理食塩液[100mL/瓶] デキサート注射液(6.6mg/2mL) デキサート注射液(3.3mg/0.5mL) ネオレスタール注射液(10mg/1mL) ガスター注射液(20mg/2mL)	100 mL 13.2mg 3.3mg 10mg 20mg	点滴末梢	メイン	30分	○	
2	生理食塩液[500mL/瓶] パクリタキセル点滴静注液	500 mL 175mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	メイン	3時間	○	
3	生理食塩液[250mL/瓶] 注射用水[20mL/A] トラスツズマブ静注用	250 mL 20mL 初回: 8mg/kg 2回目以降: 6mg/kg	点滴末梢	メイン	初回: 90分 2回目~: 30分	○	
4	生理食塩液[50mL/瓶]	50 mL	点滴末梢	メイン	フラッシュ	○	