

レジメン名称: Tmab+ペルツズマブ+ドセタキセル療法

外科・乳がん-1-3-10

診療科 : 外科

適応症 : HER2陽性乳がん 術後補助化学療法

1コース : 21日間

総コース数 : 1年

(ドセタキセルは4コース)

引用文献:

RP	医薬品名(商品名)・(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	day(1)	備考
1	生理食塩液〔50mL/瓶〕	50 mL	点滴末梢	メイン	キープ用	○	
2	生理食塩液〔250mL/瓶〕 パージェタ点滴静注	250 mL 初回: 840mg/body 2回目以降: 420mg/body	点滴末梢	メイン	初回: 90分 2回目 ~ : 30分	○	前回投与から6週以上あく場合は 840mg/bodyで行う
3	生理食塩液〔50mL/瓶〕	初回: 100mL 2回目 ~ : 50mL	点滴末梢	メイン	初回: 60分 2回目 ~ : 30分	○	
4	生理食塩液〔250mL/瓶〕 トラスツズマブ点滴静注用	250 mL 初回: 8mg/kg 2回目以降: 6mg/kg	点滴末梢	メイン	初回: 90分 2回目 ~ : 30分	○	前回投与から4週以上あく場合は 8mg/kgで行う
5	生理食塩液〔50mL/瓶〕	初回: 100mL 2回目 ~ : 50mL	点滴末梢	メイン	初回: 60分 2回目 ~ : 30分	○	
6	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL デキサート注射液(6.6mg/2mL)	3mg 6.6mg	点滴末梢	メイン	30分	○	
7	5%ブドウ糖注射液〔250mL/瓶〕 ドセタキセル点滴静注液	250 mL 75mg/m ²	点滴末梢	メイン	60分	○	
8	生理食塩液〔50mL/瓶〕	50 mL	点滴末梢	メイン	フラッシュ	○	