

レジメン名称: CapeOX療法(血管痛対策①DEX分割)

外科・大腸癌-1-2-02

診療科 : 外科

適応症 : 大腸Ca(術後補助化学療法)

1コース : 21日間

総コース数 :

引用文献 :

RP	薬品名(商品名)(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	day(1)	day(2)	day(3)	~	day(15)	備考
1	生理食塩液〔100mL/瓶〕 ホスアプレピタント点滴静注用150mg	100 mL 150mg	点滴末梢	メイン	30分	○					
2	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL デキサート注射液(3.3mg/1mL)	50 mL 3.3mg	点滴末梢	メイン	30分	○					
3	5%ブドウ糖液〔250mL/瓶〕 オキサリプラチン点滴静注液 デキサート注射液(3.3mg/1mL)	250 mL 130mg/m ² 3.3mg	点滴末梢	メイン	120分	○					
4	生理食塩液〔50mL/瓶〕	50mL	点滴末梢	メイン	フラッシュ	○					

	ゼローダ錠 2回朝・夕食後 14日間内服7日間休薬	1日 2000mg/m ²	内服			○ 夕食後 から	→ 連日	→ 連日	→ 連日	○ 朝食後 まで	
--	------------------------------	-----------------------------	----	--	--	----------------	---------	---------	---------	----------------	--