

レジメン名称: Bev+mFOLFOX6療法(ポンプ)

外科・大腸癌－1-2-11

診療科 : 外科

適応症 : 切除不能進行・再発大腸Ca

1コース : 14日間

総コース数 : PDとなるまで

引用文献:

RP	医薬品名(商品名)・(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	day(1)	day(3)	備考
1	パロノセトン点滴静注バッグ0.75mg/50mL アロカリス点滴静注235mg デキサート注射液(6.6mg/2mL)	50 mL 10mL 6.6mg	点滴中心静脈 (フィルター使用)	メイン	30分	○		
2	生理食塩液[100mL/瓶] ベバシズマブBS点滴静注	100 mL 5mg/kg	点滴中心静脈 (フィルター使用)	メイン	初回 : 90分 2回目 : 60分 3回目以降 : 30分	○		
3	5%ブドウ糖液[250mL/瓶] オキサリプラチン点滴静注液	250 mL 85mg/m ²	点滴中心静脈 (フィルター使用)	メイン	120分	○		
3'	5%ブドウ糖液[250mL/瓶] レボホリナート点滴静注用	250 mL 200mg/m ²	点滴中心静脈 (フィルター使用)	3の側管	120分	○		
4	生理食塩液[50mL/瓶] フルオロウラシル注	50 mL 400mg/m ²	点滴中心静脈 (フィルター使用)	メイン	5分	○		
5	生理食塩液[50mL/瓶] フルオロウラシル注	全量110 mL 2400mg/m ²	インフューザーポンプ	メイン	2. 5mL/h (44時間)	○		
6	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ [10mL/本]	10mL	点滴中心静脈 (フィルター使用)	メイン	フラッシュ		○	