

レジメン名称: Bev+CapeOX療法(血管痛対策)

外科・大腸癌-1-2-13

診療科 : 外科

適応症 : 切除不能進行・再発大腸Ca

1コース : 21日間 総コース数 :

引用文献 :

RP	薬品名(商品名)(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	day(1)	day(2)	day(3)	~	day(15)	備考
1	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL アロカリス点滴静注235mg デキサート注射液(3.3mg/1mL)	50 mL 10mL 3.3mg	点滴末梢	メイン	30分	○					
2	生理食塩液[100mL/瓶] ペバシズマブBS点滴静注	100 mL 7.5mg/kg	点滴末梢	メイン	初回 : 90分 2回目 : 60分 3回目以降 : 30分	○					
3	5%ブドウ糖液[500mL/瓶] デキサート注射液(3.3mg/1mL) オキサリプラチン点滴静注液	500 mL 3.3mg 130mg/m ²	点滴末梢	メイン	120分	○					
4	生理食塩液[50mL/瓶]	50mL	点滴末梢	メイン	フラッシュ	○					
	カペシタビン錠 1日2回朝・夕食後 14日間内服	2000mg/m ²	内服			○ 夕食後 から	→ 連日	→ 連日	→ 連日	○ 朝食後 まで	