

レジメン名称: Pmab+FOLFIRI療法(ポンプ)

外科・大腸癌-1-2-18

診療科 : 外科

適応症 : 切除不能進行・再発大腸Ca

1コース : 14日間

総コース数 : PDとなるまで

引用文献:

RP	医薬品名(商品名)・(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	day(1)	day(3)	備考
1	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL アロカリス点滴静注235mg デキサート注射液(6.6mg/2mL)	50 mL 10mL 6.6mg	点滴中心静脈 (フィルター使用)	メイン	30分	○		
2	生理食塩液[100mL/瓶] ベクティビックス点滴静注液	100 mL 6mg/kg	点滴中心静脈 (フィルター使用) (全量100mL)	メイン	60分	○		
3	5%ブドウ糖液[250mL/瓶] イリノテカン塩酸塩点滴静注液	250 mL 150mg/m ²	点滴中心静脈 (フィルター使用)	メイン	120分	○		
3'	5%ブドウ糖液[250mL/瓶] レボホリナート点滴静注用	250 mL 200mg/m ²	点滴中心静脈 (フィルター使用)	3の側管	120分	○		
4	生理食塩液[50mL/瓶] フルオロウラシル注	50 mL 400mg/m ²	点滴中心静脈 (フィルター使用)	メイン	5分	○		
5	生理食塩液[50mL/瓶] フルオロウラシル注	全量110mL 2400mg/m ²	インフューザーポ ンプ	メイン	2.5mL/h (44時間)	○		
6	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ [10mL/本]	10mL	フラッシュ	メイン	フラッシュ		○	