レジメン名称：Bev+IRIS療法(CPT-11+S-1)【1クール目】　　外科・大腸癌－1-2-22
診療科　　：外科
適応症　　：切除不能進行・再発大腸Ca
1コース　　：28日間　　総コース数　：PDとなるまで

引用文献：

RP	医薬品名（商品名）・（規格）	投与量	手技	ルート	投与時間	day(1)		day(15)	備考
1	生理食塩液〔100mL/瓶〕 ホスアプレピタント点滴静注用150mg	100 mL 150mg	点滴中心静脈 （フィルター使用）	メイン	30分	○		○	
2	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL デキサート注射液(6.6mg/2mL)	50 mL 6.6mg	点滴中心静脈 （フィルター使用）	メイン	30分	○		○	
3	生理食塩液〔100mL/瓶〕 **ベバシズマブ点滴静注用**	100 mL **5mg/kg**	点滴中心静脈 （フィルター使用）	メイン	初回　　：90分 2回目　　：60分	○ （90分）		○ （60分）	
4	生理食塩液〔250mL/袋〕 **イリノテカン塩酸塩点滴静注液**	250 mL **125mg/㎡**	点滴中心静脈 （フィルター使用）	メイン	90分	○		○	
5	生理食塩液〔50mL/瓶〕	50mL	点滴中心静脈 （フィルター使用）	メイン	フラッシュ	○		○	

	S-1 1日2回朝・夕食後　14日間内服 14日間休薬	**80mg/㎡/日**	内服			○ 夕食後から	→ 連日	○ 朝食後まで	