

レジメン名称: Bev+IRIS療法(CPT-11+S-1)【2クール目～】

外科・大腸癌－1-2-22

診療科 : 外科

適応症 : 切除不能進行・再発大腸Ca

1コース : 28日間

総コース数 : PDとなるまで

引用文献:

RP	医薬品名(商品名)・(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	day(1)		day(15)	備考
1	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL アロカリス点滴静注235mg デキサート注射液(6.6mg/2mL) デキサート注射液(3.3mg/1mL)	50 mL 10mL 6.6mg 3.3mg	点滴中心静脈 (フィルター使用)	メイン	30分	○		○	
2	生理食塩液〔100mL/瓶〕 ベバシズマブBS点滴静注	100 mL 5mg/kg	点滴中心静脈 (フィルター使用)	メイン	30分	○		○	
3	生理食塩液〔250mL/袋〕 イリノテカン塩酸塩点滴静注液	250 mL 125mg/m ²	点滴中心静脈 (フィルター使用)	メイン	90分	○		○	
4	生理食塩液〔50mL/瓶〕	50mL	点滴中心静脈 (フィルター使用)	メイン	フラッシュ	○		○	
	S-1 1日2回朝・夕食後 14日間内服 14日間休薬	80mg/m ² /日	内服			○ 夕食後 から	→ 連日	○ 朝食後 まで	