

レジメン名称: RAM+FOLFIRI療法(ポンプ)

外科・大腸癌－1-2-23

診療科 : 外科

適応症 : 切除不能進行・再発大腸Ca

1コース : 14日間

総コース数 : PDとなるまで

引用文献:

RP	医薬品名(商品名)・(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	day(1)	day(3)	備考
1	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL アロカリス点滴静注235mg デキサート注射液(6.6mg/2mL) ポララミン注(5mg/1mL)	50 mL 10mL 6.6mg 5mg	点滴中心静脈 (フィルター使用)	メイン	30分	○		
2	生理食塩液〔250mL/袋〕 サイラムザ点滴注射液	250 mL 8mg/kg (全量250mL)	点滴中心静脈 (フィルター使用)	メイン	60分	○		
3	生理食塩液〔100mL/瓶〕	100mL	点滴中心静脈 (フィルター使用)	メイン	60分(経過観察)	○		
4	5%ブドウ糖液〔250mL/瓶〕 イリノテカン塩酸塩点滴静注液	250 mL 150mg/m ²	点滴中心静脈 (フィルター使用)	メイン	120分	○		
4'	5%ブドウ糖液〔250mL/瓶〕 レボホリナート点滴静注用	250 mL 200mg/m ²	点滴中心静脈 (フィルター使用)	5の側管	120分	○		
5	5%ブドウ糖液〔50mL/瓶〕 フルオロウラシル注	50 mL 400mg/m ²	点滴中心静脈 (フィルター使用)	メイン	5分	○		
6	ラクテック注〔1000mL/袋〕 フルオロウラシル注	全量110 mL 2400mg/m ²	インフューザー ポンプ	メイン	2.5mL/h (44時間)	○		