

レジメン名称: Bev+SOX療法

外科・大腸癌-1-2-27

診療科 : 外科

適応症 : 切除不能進行・再発大腸Ca

1コース : 21日間

総コース数 : PDとなるまで

引用文献:

RP	医薬品名(商品名)・(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	day(1)	day(2)	day(3)	~	day(15)	備考
1	生理食塩液[100mL/瓶] ホスアプレピタント点滴静注用150mg	100 mL 150 mg	点滴中心静脈 (フィルター使用)	メイン	30分	○					
2	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL デキサート注射液(6.6mg/2mL)	50 mL 6.6mg	点滴中心静脈 (フィルター使用)	メイン	30分	○					
3	生理食塩液[100mL/瓶] ペバシズマブ点滴静注用	100 mL 7.5mg/kg	点滴中心静脈 (フィルター使用)	メイン	初回 : 90分 2回目 : 60分 3回目以降 : 30分	○					
4	5%ブドウ糖液[250mL/瓶] オキサリプラチン点滴静注液	250 mL 130mg/m ²	点滴中心静脈 (フィルター使用)	メイン	120分	○					
5	生理食塩液[50mL/瓶]	50mL	点滴中心静脈 (フィルター使用)	メイン	フラッシュ	○					

S-1 1日2回朝・夕食後 14日間内服 7日間休薬	80~120mg/日	内服				○ 夕食後 から	→ 連日	→ 連日	→ 連日	○ 朝食後 まで	
デカドロン錠 0.5mg 1回8錠 1日2回 朝・昼食後 2日間内服	1日16錠(8mg)	内服					○	○			