

レジメン名称: Biweekly Cmab+CPT-11療法

外科・大腸癌－1-2-30

診療科 : 外科

適応症 : 切除不能進行・再発大腸Ca

1コース : 14日間

総コース数 : PDとなるまで

引用文献:

| RP | 医薬品名(商品名)・(規格)                                                                             | 投与量                                         | 手技                  | ルート | 投与時間                   | day(1) | day(8) | 備考 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----|------------------------|--------|--------|----|
| 1  | パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL<br>アロカリス点滴静注235mg<br>デキサート注射液(6.6mg/2mL)<br>ネオレスタール注射液(10mg/1mL) | 50 mL<br>10mL<br>6.6mg<br>10mg              | 点滴中心静脈<br>(フィルター使用) | メイン | 30分                    | ○      |        |    |
| 2  | 生理食塩液〔250mL/袋〕<br>アービタックス注射液                                                               | 250 mL<br>500mg/m <sup>2</sup><br>(全量250mL) | 点滴中心静脈<br>(フィルター使用) | メイン | 初回 : 120分<br>2回目 : 60分 | ○      |        |    |
| 3  | 生理食塩液〔100mL/瓶〕                                                                             | 100mL                                       | 点滴中心静脈<br>(フィルター使用) | メイン | 60分(経過観察)              | ○      |        |    |
| 4  | 生理食塩液〔250mL/瓶〕<br>イリノテカン塩酸塩点滴静注液                                                           | 250 mL<br>150mg/m <sup>2</sup>              | 点滴中心静脈<br>(フィルター使用) | メイン | 90分                    | ○      |        |    |
| 5  | 生理食塩液〔50mL/瓶〕                                                                              | 50mL                                        | 点滴中心静脈<br>(フィルター使用) | メイン | フラッシュ                  | ○      |        |    |