

レジメン名称: Biweekly Cmab+CPT-11療法

外科・大腸癌-1-2-30

診療科 : 外科

適応症 : 切除不能進行・再発大腸Ca

1コース : 14日間

総コース数 : PDとなるまで

引用文献:

RP	医薬品名(商品名)・(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	day(1)	day(8)	備考
1	生理食塩液[100mL/瓶] ホスアプレピタント点滴静注用150mg	100 mL 150mg	点滴中心静脈 (フィルター使用)	メイン	30分	○		
2	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL デキサート注射液(6.6mg/2mL) ネオレスタール注射液(10mg/1mL)	50 mL 6.6mg 10mg	点滴中心静脈 (フィルター使用)	メイン	30分	○		
3	生理食塩液[250mL/袋] アービタックス注射液	250 mL <b>500mg/m<sup>2</sup></b> (全量250mL)	点滴中心静脈 (フィルター使用)	メイン	初回 : 120分 2回目 : 60分	○		
4	生理食塩液[100mL/瓶]	100mL	点滴中心静脈 (フィルター使用)	メイン	60分(経過観察)	○		
5	生理食塩液[250mL/瓶] イリノテカン塩酸塩点滴静注液	250 mL <b>150mg/m<sup>2</sup></b>	点滴中心静脈 (フィルター使用)	メイン	90分	○		
6	生理食塩液[50mL/瓶]	50mL	点滴中心静脈 (フィルター使用)	メイン	フラッシュ	○		