

レジメン名称: CapeOX療法

外科・大腸癌-1-2-34

診療科 : 外科

適応症 : 切除不能進行・再発大腸Ca

1コース : 21日間

総コース数 :

引用文献 :

RP	薬品名(商品名)(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	day(1)	day(2)	day(3)	~	day(15)	備考
1	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL アロカリス点滴静注235mg デキサート注射液(6.6mg/2mL)	50 mL 10mL 6.6mg	点滴中心静脈 (フィルター使用)	メイン	30分	○					
2	5%ブドウ糖液[250mL/瓶] オキサリプラチン点滴静注液	250 mL 130mg/m ²	点滴中心静脈 (フィルター使用)	メイン	120分	○					
3	生理食塩液[50mL/瓶]	50mL	点滴中心静脈 (フィルター使用)	メイン	フラッシュ	○					

	カペシタビン錠 1日2回朝・夕食後 14日間内服7日間休薬	2000mg/m ²	内服			○ 夕食後 から	→ 連日	→ 連日	→ 連日	○ 朝食後 まで	
	デカドロン錠 4mg 1回1錠 1日2回 朝・昼食後 2日間内服	1日2錠(8mg)	内服				○	○			