

レジメン名称:トラスツズマブ+ペルツズマブ療法

外科・大腸がんー1-2-37

診療科 : 外科

適応症 : がん化学療法後に増悪したHER2陽性治癒切除不能な進行・再発結腸・直腸がん

1コース : 21日間

総コース数 : PDとなるまで

引用文献:

RP	医薬品名(商品名)・(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	day(1)	備考
1	生理食塩液〔50mL/瓶〕	50 mL	点滴末梢	メイン	キープ用	○	
2	生理食塩液〔250mL/瓶〕 パージェタ点滴静注	250 mL 初回:840mg/body 2回目以降:420mg/body	点滴末梢	メイン	初回:90分 2回目~:30分	○	前回投与から6週以上あく場合は 840mg/bodyで行う
3	生理食塩液〔50mL/瓶〕	初回:100mL 2回目~:50mL	点滴末梢	メイン	初回:60分 2回目~:30分	○	
4	生理食塩液〔250mL/瓶〕 トラスツズマブ点滴静注用	250 mL 初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	点滴末梢	メイン	初回:90分 2回目~:30分	○	前回投与から4週以上あく場合は 8mg/kgで行う
5	生理食塩液〔50mL/瓶〕	50 mL	点滴末梢	メイン	フラッシュ	○	