

レジメン名称:CAPIRI療法  
 診療科 :外科  
 適応症 :切除不能進行・再発大腸Ca  
 1コース :21日間

外科・大腸癌－1-2-38

総コース数 :

引用文献 :Lancet Oncol 2018;19:660  
 Capeの用法・用量は、AXEPT試験における規定に従い設定

RP	薬品名(商品名)(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	day(1)	day(2)	day(3)	～	day(15)	備考
1	生理食塩液〔100mL/瓶〕 ホスアプレピタント点滴静注用150mg	100 mL 150mg	点滴末梢	メイン	30分	○					
2	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg デキサート注射液(6.6mg/2mL)	50 mL 6.6mg	点滴末梢	メイン	30分	○					
3	5%ブドウ糖液〔250mL/瓶〕 イリノテカン点滴静注液	250 mL 200mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	メイン	90分	○					
4	生理食塩液〔50mL/瓶〕	50mL	点滴末梢	メイン	フラッシュ	○					
	カペシタビン錠 1日2回朝・夕食後 14日間内服	1600mg/m <sup>2</sup> /day	内服			○ 夕食後 から	→ 連日	→ 連日	→ 連日	○ 朝食後 まで	
	デカドロン錠 0.5mg 1回8錠 1日2回 朝・昼食後 2日間内服	1日16錠(8mg)	内服				○	○			