

レジメン名称:Pmab+sLV5FU療法

外科・大腸癌－1-2-41

診療科 : 外科

適応症 : 切除不能進行・再発大腸Ca

1コース : 14日間

総コース数 : PDとなるまで

引用文献:

RP	医薬品名(商品名)・(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	day(1)	day(3)	備考
1	生理食塩液〔100mL/瓶〕 デキサート注射液(6.6mg/2mL)	100 mL 6.6mg	点滴中心静脈 (フィルター使用)	メイン	30分	○		
2	生理食塩液〔100mL/瓶〕 ベクティビックス点滴静注液	100 mL 6mg/kg	点滴中心静脈 (フィルター使用) (全量100mL)	メイン	60分	○		
3	5%ブドウ糖液〔250mL/瓶〕 レボホリナート点滴静注用	250 mL 200mg/m ²	点滴中心静脈 (フィルター使用)	メイン	120分	○		
4	5%ブドウ糖液〔50mL/瓶〕 フルオロウラシル注	50 mL 400mg/m ²	点滴中心静脈 (フィルター使用)	メイン	5分	○		
5	ラクテック注〔1000mL/袋〕 フルオロウラシル注	1000 mL 2400mg/m ²	点滴中心静脈 (フィルター使用)	メイン	46時間	○		
6	生理食塩液〔50mL/瓶〕	50mL	点滴中心静脈 (フィルター使用)	メイン	フラッシュ		○	