

獨協医科大学日光医療センター 化学療法レジメン

レジメン名称: CDDP+PEM+Bev  
 診療科 : 呼吸器内科  
 適応症 : 非小細胞肺がん  
 1コース : 21日間

呼吸器・NSCLC-3-2-03

RP	医薬品名(商品名)・(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	投与7日前	day(1)	~	day(22)	備考
1	生理食塩液[100mL/瓶] アロキシ静注(0.75mg/5mL) デキサート注射液(6.6mg/2mL)	100 mL 0.75mg 6.6mg	点滴末梢	メイン	30分		○			
2	ソルデム3A輸液[500mL/袋]	500 mL	点滴末梢	メイン	60分		○			
3	ラクテック注[500mL/袋]	500 mL	点滴末梢	メイン	60分		○			
4	生理食塩液[100mL/瓶] アリムタ注射用	100 mL 500mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	メイン	10分		○			
5	ソルデム3A輸液[200mL/袋]	200 mL	点滴末梢	メイン	30分		○			
6	生理食塩液[500mL/袋] シスプラチン注	全量500 mL 75mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	メイン	120分		○			
7	ラクテック注[500mL/袋] メクロプラミド注射液(10mg/2mL)	500 mL 10mg	点滴末梢	メイン	90分		○			
8	生理食塩液[100mL/瓶] アバスチン点滴静注液	100 mL 15mg/kg	点滴末梢	メイン	初回 : 90分 2回目 : 60分 3回目 ~ : 30分		○			
9	20%マンニトール注射液300mL	300mL	点滴末梢	メイン	60分		○			
10	ソルデム3A輸液[500mL/袋]	500 mL	点滴末梢	メイン	90分		○			
	フォリアミン錠5mg 0.1錠 1日1回 アリムタ投与7日以上前から最終投与日から 22日目まで可能な限り継続	0.1錠(0.5mg)	内服				○	連日	→	→
	メチコパール注射液500μg 2A アリムタ投与7日以上前に1日1回 以降アリムタ使用中は9週ごとに2A(1mg)を反復	2A(1mg)	筋注				○			9週毎反復投与