

レジメン名称: PEM+Bev  
 診療科 : 呼吸器内科  
 適応症 : 非小細胞肺がん  
 1コース : 21日間

呼吸器・NSCLC-3-2-04

総コース数 :

引用文献:

RP	医薬品名(商品名)・(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	投与7日前	day(1)	~	day(22)	備考
1	生理食塩液[100mL/瓶] デキサート注射液(6.6mg/2mL)	100 mL 6.6mg	点滴末梢	メイン	30分		○			
2	ペトレキセド点滴静注液 生理食塩液[100mL/瓶]	500mg/m <sup>2</sup> 全量100mL	点滴末梢	メイン	10分		○			
3	生理食塩液[100mL/瓶] アバステン点滴静注液	100 mL 15mg/kg	点滴末梢	メイン	初回 : 90分 2回目 : 60分 3回目~ : 30分		○			
4	生理食塩液[50mL/瓶]	50 mL	点滴末梢	メイン	全開		○			

	フォリアミン錠5mg 0.1錠 1日1回 アリムタ投与7日以上前から最終投与日から 22日目まで可能な限り継続	0.1錠(0.5mg)	内服				○	連日	→	→	
	メチコパール注射液500μg 2A アリムタ投与7日以上前に1日1回 以降アリムタ使用中は9週ごとに2A(1mg)を反	2A(1mg)	筋注				○				9週毎反復投与