

レジメン名称: CBDCA(AUC5)+S-1投与法

呼吸器・NSCLC-3-2-09

診療科 : 呼吸器内科
 適応症 : 非小細胞肺がん
 1コース : 21日間

総コース数 :

引用文献:

RP	医薬品名(商品名)・(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	day(1)		day(14)	備考
1	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL アロカリス点滴静注235mg デキサート注射液(6.6mg/2mL)	50 mL 10mL 2mL	点滴末梢	メイン	30分	○			
2	生理食塩液[250mL/袋] カルボプラチン点滴静注液	250 mL AUC5 (最大 800mg/body)	点滴末梢	メイン	60分	○			
3	生理食塩液[100mL/瓶]	100 mL	点滴末梢	メイン	全開	○			

S-1 配合OD錠 1日2回朝・夕食後 14日間内服 7日間休薬	*	内服			○	→ 連日	○	
-------------------------------------	---	----	--	--	---	---------	---	--

*		
S-1 体表面積	1.25/㎡未満	1回40mgを1日2回=80mg/日
	1.25以上1.5/㎡未満	1回50mgを1日2回=100mg/日
	1.5/㎡以上	1回60mgを1日2回=120mg/日

カルボプラチン=AUC 5 × (GFR* + 25) = () mg/body		
* GFRはCockcroft-Gault式を用いる	男性; GFR= $\frac{(140-\text{年齢}) \times \text{体重kg}}{\text{血清クレアチニン} \times 72}$	女性; GFR= $\frac{(140-\text{年齢}) \times \text{体重kg}}{\text{血清クレアチニン} \times 72} \times 0.85$