

レジメン名称:Pembrolizumab+PEM療法(メンテナンス)

呼吸器・NSCLC－3-2-20

診療科 :呼吸器内科  
 適応症 :非小細胞肺がん  
 1コース :21日間

総コース数:

引用文献:

| RP | 医薬品名(商品名)・(規格)                                                 | 投与量                             | 手技                | ルート | 投与時間  | 投与7日前 | day(1) | ～ | day(22) | 備考      |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------|-------|--------|---|---------|---------|
| 1  | 生理食塩液〔50mL/瓶〕                                                  | 50mL                            | 点滴末梢              | メイン | キープ   |       | ○      |   |         |         |
| 2  | 生理食塩液〔50mL/瓶〕<br>キイトルーダ点滴静注液                                   | 50mL<br>200mg/body              | 点滴末梢<br>(フィルター使用) | メイン | 30分   |       | ○      |   |         |         |
| 3  | 生理食塩液〔50mL/瓶〕                                                  | 50 mL                           | 点滴末梢              | メイン | フラッシュ |       | ○      |   |         |         |
| 4  | 生理食塩液〔100mL/瓶〕<br>デキサート注射液(6.6mg/2mL)                          | 100 mL<br>6.6mg                 | 点滴末梢              | メイン | 30分   |       |        |   |         |         |
| 5  | ペメトレキセド点滴静注液<br>生理食塩液〔100mL/瓶〕                                 | 500mg/m <sup>2</sup><br>全量100mL | 点滴末梢              | メイン | 10分   |       | ○      |   |         |         |
| 6  | 生理食塩液〔50mL/瓶〕                                                  | 50 mL                           | 点滴末梢              | メイン | フラッシュ |       | ○      |   |         |         |
|    | フォリアミン錠5mg 0.1錠1日1回<br>アリムタ投与7日以上前から最終投与日から22日目まで可能な限り継続       | 0.1錠(0.5mg)                     | 内服                |     |       | ○     | 連日     | → | →       |         |
|    | メチコパール注射液500μg 2A<br>アリムタ投与7日以上前に1日1回以降アリムタ使用中は9週ごとに2A(1mg)を反復 | 2A(1mg)                         | 筋注                |     |       | ○     |        |   |         | 9週毎反復投与 |

\* CBDCA+Pembrolizumab+PEMのメンテナンスとして使用