

レジメン名称:Pembrolizumab+PEM療法(メンテナンス)

呼吸器・NSCLC-3-2-25

診療科 :呼吸器内科  
 適応症 :非小細胞肺がん  
 1コース :21日間

総コース数:

引用文献:

RP	医薬品名(商品名)・(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	投与7日前	day(1)	~	day(22)	備考
1	生理食塩液〔50mL/瓶〕	50mL	点滴末梢	メイン	キープ		○			
2	生理食塩液〔50mL/瓶〕 キイトルーダ点滴静注液	50mL 200mg/body	点滴末梢 (フィルター使用)	メイン	30分		○			
3	生理食塩液〔50mL/瓶〕	50 mL	点滴末梢	メイン	フラッシュ		○			
4	生理食塩液〔100mL/瓶〕 デキサート注射液(6.6mg/2mL)	100 mL 6.6mg	点滴末梢	メイン	30分					
5	ペムトレキセド点滴静注液 生理食塩液〔100mL/瓶〕	500mg/m <sup>2</sup> 全量100mL	点滴末梢	メイン	10分		○			
6	生理食塩液〔50mL/瓶〕	50 mL	点滴末梢	メイン	フラッシュ		○			
	フォリアミン錠5mg 0.1錠1日1回 アリムタ投与7日以上前から最終投与日から22日目まで可能な限り継続	0.1錠(0.5mg)	内服				○	連日	→	→
	メチコパール注射液500μg 2A アリムタ投与7日以上前に1日1回 以降アリムタ使用中は9週ごとに2A(1mg)を反復	2A(1mg)	筋注				○			9週毎反復投与

\* CBDCA+Pembrolizumab+PEMのメンテナンスとして使用