

レジメン名称: アテゾリズマブ＋ベバシズマブ＋CBDCA＋PTX療法
 診療科 : 呼吸器内科
 適応症 : 切除不能な進行・再発の非小細胞肺がん
 1コース : 21日間

呼吸器・NSCLC－3-2-26

総コース数: 4

引用文献: 国際共同第Ⅲ相臨床試験(IMpower150試験)

RP	医薬品名(商品名)・(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	day(1)	備考
1	生理食塩液〔50mL/瓶〕	50mL	点滴末梢 (フィルター使用)	メイン	キープ	○	
2	生理食塩液〔250mL/袋〕 デセントリク点滴静注	250 mL 1200mg/body(固定量)	点滴末梢 (フィルター使用)	メイン	初回 : 60分 2回目～ : 30分	○	
3	生理食塩液〔50mL/瓶〕	50 mL	点滴末梢 (フィルター使用)	メイン	全開	○	
4	生理食塩液〔100mL/瓶〕 ベバシズマブBS点滴静注	合わせて100 mL 15mg/kg	点滴末梢	メイン	初回 : 90分 2回目 : 60分 3回目～ : 30分	○	
5	パロノセトロン点滴静注バッグ(0.75mg/50mL) アロカリス点滴静注(235mg/10mL) デキサート注射液(6.6mg/2mL) ネオレスタール注射液(10mg/1mL) ファモチジン注射液(20mg/2mL)	50 mL 10mL 6mL 1mL 2mL	点滴末梢	メイン	30分	○	
6	生理食塩液〔500mL/袋〕 パクリタキセル点滴静注液	500 mL 175mg/m ²	点滴末梢 (フィルター使用)	メイン	180分	○	
7	生理食塩液〔250mL/袋〕 カルボプラチン点滴静注液	250 mL AUC6 (最大800mg/body)	点滴末梢	メイン	60分 (外来では30分でも可)	○	
8	生理食塩液〔50mL/瓶〕	50 mL	点滴末梢	メイン	フラッシュ	○	

カルボプラチン＝AUC 6 × (GFR * + 25) = () mg/body

* GFRはCockcroft-Gault式を用いる

男性: GFR = $\frac{(140 - \text{年齢}) \times \text{体重kg}}{\text{血清クレアチニン} \times 72}$

女性: GFR = $\frac{(140 - \text{年齢}) \times \text{体重kg}}{\text{血清クレアチニン} \times 7} \times 0.85$