

レジメン名称: CBDCA+PEM+アミバンタマブ(ライブリバンド)療法(80kg以下)

呼吸器・NSCLC-3-2-27-4

診療科 : 呼吸器内科

適応症 : EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

1コース : 21日間

総コース数: 4サイクル

5クール目以降維持

引用文献:

RP	医薬品名(商品名)・(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	day(1)	備考
1	生理食塩液[100mL/瓶] デキサート注射液(6.6mg/2mL) ポラミン注5mg/1mL	100mL 2mL 1mL	点滴末梢	メイン	30分	○	
2	ペトレキセド点滴静注液 生理食塩液[100mL/瓶]	500mg/m ² 全量100mL	点滴末梢	メイン	10分	○	
3	生理食塩液[50mL/瓶]	50 mL	点滴末梢	メイン	全開	○	
4	生理食塩液[250mL/袋] ライブリバンド点滴静注液	215mL 1750mg	点滴末梢	メイン	2時間	○	
5	生理食塩液[50mL/瓶]	50 mL	点滴末梢	メイン	フラッシュ	○	
	カロナール錠200mg 1回5錠 1日1回 ライブリバンド投与30-60分前に内服	5錠	内服			○	

