

レジメン名称:ラムシルマブ+nab PTX療法(サイラムザ+アブラキサン)

外科・胃癌-1-1-07

診療科 : 外科

適応症 : 切除不能進行・再発胃がん

1コース : 28日間

総コース数 :

引用文献 : RAINBOW試験(Wilke H,et al.:Lancet Oncol 15:1224-35,2014)

RP	医薬品名(商品名)・(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	day(1)	day(8)	day(15)	備考
1	グラニセトロン点滴静注バッグ(3mg/100mL) デキサート注射液(6.6mg/2mL) ネオレストール注射液(10mg/1mL)	100 mL 6.6mg 10mg	点滴末梢	メイン	30分	○	/	○	
2	生理食塩液[100mL/瓶] デキサート注射液(6.6mg/2mL)	100 mL 6.6mg	点滴末梢	メイン	30分	/	○	/	
3	生理食塩液[250mL/袋] サイラムザ点滴静注液	全量250 mL 8mg/kg	点滴末梢	メイン	60分	○	/	○	
4	生理食塩液[100mL/瓶] 生理食塩液[50mL/瓶]	初回・2回目 100 mL 3回目~50mL	点滴末梢	メイン	初回・2回目60分 3回目以降フラッシュ	○	/	○	
5	生理食塩液[50mL/瓶] アブラキサン点滴静注用	ボトルは空に 80mg/m ²	点滴末梢 【フィルター禁止】	メイン	30分	○	○	○	
6	生理食塩液[50mL/瓶]	50 mL	点滴末梢	メイン	フラッシュ	○	○	○	