

レジメン名称 : CapeOX療法【I-OHP130mg/m<sup>2</sup>】

外科・胃癌-1-1-14-1

診療科 : 外科

適応症 : 切除不能進行・再発胃がん

1コース : 21日間

総コース数 :

引用文献 : REAL-2試験

| RP | 薬品名(商品名)(規格)  | 投与量                            | 手技   | ルート | 投与時間  | day(1)         | ~       | day(15)        | 備考 |
|----|---|--------------------------------|------|-----|-------|----------------|---------|----------------|----|
| 1  | パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL<br>アロカリス点滴静注(235mg/10mL)<br>デキサート注射液(6.6mg/2mL) | 50mL<br>10mL<br>6.6mg          | 点滴末梢 | メイン | 30分   | ○              |         |                |    |
| 2  | 5%ブドウ糖液〔250mL/瓶〕<br>オキサリプラチン点滴静注液   | 250 mL<br>130mg/m <sup>2</sup> | 点滴末梢 | メイン | 120分  | ○              |         |                |    |
| 3  | 生理食塩液〔50mL/瓶〕   | 50mL                           | 点滴末梢 | メイン | フラッシュ | ○              |         |                |    |
|    | <b>カペシタビン錠</b><br>1日2回朝・夕食後 14日間内服7日間休薬                                   | 2000mg/m <sup>2</sup>          | 内服   |     |       | ○<br>夕食後<br>から | →<br>連日 | ○<br>朝食後<br>まで |    |