

レジメン名称: CapeOX療法【I-OHP100mg/m<sup>2</sup>】(血管痛対策)

外科・胃癌-1-1-14-2

診療科 : 外科

適応症 : 切除不能進行・再発胃がん

1コース : 21日間

総コース数 :

引用文献 : REAL-2試験

RP	薬品名(商品名)(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	day(1)	~	day(15)	備考
1	生理食塩液〔100mL/瓶〕 ホスアプレピタント点滴静注用150mg	100 mL 150mg	点滴末梢	メイン	30分	○			
2	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL デキサート注射液(3.3mg/1mL)	50 mL 3.3mg	点滴末梢	メイン	30分	○			
3	5%ブドウ糖液〔500mL/瓶〕 オキサリプラチン点滴静注液 デキサート注射液(3.3mg/1mL)	500mL 100mg/m <sup>2</sup> 3.3mg	点滴末梢	メイン	120分	○			
4	生理食塩液〔50mL/瓶〕	50mL	点滴末梢	メイン	フラッシュ	○			

	カペシタビン錠 1日2回朝・夕食後 14日間内服7日間休薬	2000mg/m <sup>2</sup>	内服			○ 夕食後 から	→ 連日	○ 朝食後 まで	
--	----------------------------------	-----------------------	----	--	--	----------------	---------	----------------	--