

レジメン名称: Tmab+CapeOX療法(血管痛用)【1クール目】

外科・胃癌-1-1-18

診療科 : 外科

適応症 : 切除不能進行・再発胃がん

1コース : 21日間

総コース数 :

引用文献 :

RP	薬品名(商品名)(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	day(1)	～	day(15)	備考
1	生理食塩液〔50mL/瓶〕	50mL	点滴末梢	メイン	キープ	○			
2	生理食塩液〔250mL/瓶〕 注射用水 トラスツズマブBS点滴静注用	250 mL 20mL 8mg/kg	点滴末梢	メイン	90分	○			
3	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL アロカリス点滴静注(235mg/10mL) デキサート注射液(3.3mg/1mL)	50 mL 10mL 1mL	点滴末梢	メイン	30分	○			
4	5%ブドウ糖液〔500mL/瓶〕 オキサリプラチン点滴静注液 デキサート注射液(3.3mg/1mL)	500 mL 130mg/m <sup>2</sup> 1mL	点滴末梢	メイン	120分	○			
5	生理食塩液〔50mL/瓶〕	50mL	点滴末梢	メイン	フラッシュ	○			
	カペシタビン錠 1日2回朝・夕食後 14日間内服7日間休薬	2000mg/m <sup>2</sup>	内服			○ 夕食後 から	→ 連日	○ 朝食後 まで	