

レジメン名称 : Tmab+SOX療法【1クール目】

外科・胃癌-1-1-20

診療科 : 外科

適応症 : 切除不能進行・再発 HER2陽性胃がん

1コース : 21日間

総コース数 : PDとなるまで

引用文献 : 第Ⅱ相試験の報告より

胃癌治療ガイドライン第5版ではCDDPが使用できない、あるいは外来治療を希望するなど条件付きで推奨)

RP	薬品名(商品名)(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	~	day(15)	備考
1	生理食塩液〔50mL/瓶〕	50mL	点滴末梢	メイン	キープ	○						
2	生理食塩液〔250mL/瓶〕 注射用水(溶解用) トラスツズマブBS点滴静注用	250 mL 40mL 8mg/kg	点滴末梢	メイン	90分	○						
3	生理食塩液〔100mL/瓶〕 ホスアプレピタント点滴静注用150mg	100 mL 150mg	点滴末梢	メイン	30分	○						
4	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL デキサート注射液(6.6mg/2mL)	50 mL 6.6mg	点滴末梢	メイン	30分	○						
5	5%ブドウ糖液〔250mL/瓶〕 オキサリプラチン点滴静注液	250 mL 130mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	メイン	120分	○						
4	生理食塩液〔50mL/瓶〕	50mL	点滴末梢	メイン	フラッシュ	○						

	エヌケーエスワン配合OD錠 1日2回 朝・夕食後 14日間内服、7日間休薬	80mg/m <sup>2</sup>		内服		○ 夕食後 から開始	→ 連日	→ 連日	→ 連日	→ 連日	○ 朝食後 まで	
	デカドロン錠 0.5mg 1回8錠 1日2回 朝・昼食後 オキサリプラチン投与翌日～ 3日間内服	1日16錠(8mg)		内服		/	○	○	○	/	/	