

レジメン名称: Tmab+SOX療法(血管痛対策)【1クール目】

外科・胃癌－1-1-20

診療科 : 外科

適応症 : 切除不能進行・再発 HER2陽性胃癌

1コース : 21日間

総コース数 : PDとなるまで

引用文献 : 第Ⅱ相試験の報告より

胃癌治療ガイドライン第5版ではCDDPが使用できない、あるいは外来治療を希望するなど条件付きで推奨)

RP	薬品名(商品名)(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	day(1)	～	day(15)	備考
1	生理食塩液〔50mL/瓶〕	50mL	点滴末梢	メイン	キープ	○			
2	生理食塩液〔250mL/瓶〕 注射用水(溶解用) トラスツズマブBS点滴静注用	250 mL 40mL 8mg/kg	点滴末梢	メイン	90分	○			
3	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL アロカリス点滴静注(235mg/10mL) デキサート注射液(3.3mg/1mL)	50mL 10mL 3.3mg	点滴末梢	メイン	30分	○			
4	5%ブドウ糖液〔500mL/瓶〕 オキサリプラチン点滴静注液 デキサート注射液(3.3mg/1mL)	500 mL 100mg/m ² 3.3mg	点滴末梢	メイン	120分	○			
5	生理食塩液〔50mL/瓶〕	50mL	点滴末梢	メイン	フラッシュ	○			
	S-1配合OD錠 1日2回 朝・夕食後 14日間内服、7日間休薬	BSA<1.25m ² 80mg/day 1.25≤BSA<1.5m ² 100mg/day 1.5m ² ≤BSA 120mg/day	内服			○ 夕食後 から開始	→ 連日	○ 朝食後 まで	