

レジメン名称: SOX+Nivolumab療法(血管痛対策)

外科・胃癌-1-1-24

診療科 : 外科  
 適応症 : 切除不能進行・再発胃がん  
 1コース : 21日間

総コース数 : PDとなるまで

引用文献:

医薬品名(商品名)・(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	day(1)		day(15)	備考
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL アロカリス点滴静注(235mg/10mL) デキサート注射液(3.3mg/2mL)	50mL 10mL 3.3mg	点滴末梢	メイン	30分	○			
生理食塩液[100mL/瓶] オプジーボ点滴静注	100 mL 360mg/body	点滴末梢 (フィルター使用)	メイン	30分	○			
5%ブドウ糖液[50mL/瓶]	50 mL	点滴末梢	メイン	フラッシュ	○			
5%ブドウ糖液[500mL/瓶] オキサリプラチン点滴静注液 デキサート注射液(3.3mg/1mL)	500 mL 100mg/m <sup>2</sup> 3.3mg	点滴末梢	メイン	120分	○			
生理食塩液[50mL/瓶]	50mL	点滴末梢	メイン	フラッシュ	○			
<b>S-1配合OD錠</b> 1日2回 朝・夕食後 14日間内服、7日間休薬	BSA<1.25m <sup>2</sup> 80mg/day 1.25≤BSA<1.5m <sup>2</sup> 100mg/day 1.5m <sup>2</sup> ≤BSA 120mg/day	内服			○ 夕食後 から	→ 連日	○ 朝食後 まで	