

レジメン名称: SOX+Nivolumab療法(血管痛対策②DEX分割+5%ブドウ糖500mL)

外科・胃癌-1-1-24

診療科 : 外科
 適応症 : 切除不能進行・再発胃がん
 1コース : 21日間

総コース数 : PDとなるまで

引用文献:

RP	医薬品名(商品名)・(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	day(1)		day(15)	備考
1	生理食塩液[100mL/瓶] ホスアプレピタント点滴静注用150mg	100 mL 150mg	点滴末梢	メイン	30分	○			
2	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL デキサート注射液(3.3mg/1mL)	50 mL 1mL	点滴末梢	メイン	30分	○			
3	生理食塩液[100mL/瓶] オプジーボ点滴静注	100 mL 360mg/body	点滴末梢 (フィルター使用)	メイン	30分	○			
4	5%ブドウ糖液[50mL/瓶]	50 mL	点滴末梢	メイン	フラッシュ	○			
5	5%ブドウ糖液[500mL/瓶] オキサリプラチン点滴静注液 デキサート注射液(3.3mg/1mL)	500 mL 130mg/m ² 1mL	点滴末梢	メイン	120分	○			
6	生理食塩液[50mL/瓶]	50mL	点滴末梢	メイン	フラッシュ	○			
	エヌケーエスワン配合OD錠 1日2回 朝・夕食後 14日間内服、7日間休薬	BSA<1.25m ² 80mg/day 1.25≤BSA<1.5m ² 100mg/day 1.5m ² ≤BSA 120mg/day	内服			○ 夕食後 から	→ 連日	○ 朝食後 まで	