

レジメン名称: CapeOX+Nivolumab療法

外科・胃癌-1-1-25

診療科 : 外科
 適応症 : 切除不能進行・再発胃がん
 1コース : 21日間

総コース数 : PDとなるまで

引用文献:

| RP | 医薬品名(商品名)・(規格) | 投与量 | 手技 | ルート | 投与時間 | day(1) | | day(15) | 備考 |
|----|--|--------------------------------|-------------------|-----|-------|--------|--|---------|----|
| 1 | 生理食塩液[100mL/瓶] ホスアプレピタント点滴静注用150mg | 100 mL 150mg | 点滴末梢 | メイン | 30分 | ○ | | | |
| 2 | パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL デキサート注射液(6.6mg/2mL) | 50 mL 6.6mg | 点滴末梢 | メイン | 30分 | ○ | | | |
| 3 | 生理食塩液[100mL/瓶] オブジーボ点滴静注 | 100 mL 360mg/body | 点滴末梢 (フィルター使用) | メイン | 30分 | ○ | | | |
| 4 | 5%ブドウ糖液[50mL/瓶] | 50 mL | 点滴末梢 | メイン | フラッシュ | ○ | | | |
| 5 | 5%ブドウ糖液[250mL/瓶] オキサリプラチン点滴静注液 | 250 mL 130mg/m ² | 点滴末梢 | メイン | 120分 | ○ | | | |
| 6 | 生理食塩液[50mL/瓶] | 50mL | 点滴末梢 | メイン | フラッシュ | ○ | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|----|--|--|--|----------------|---------|----------------|--|
| カペシタビン錠 1日2回朝・夕食後 14日間内服7日間休薬 | BSA<1.36m ² : 2400mg/日 1.36m ² ≤ BSA < 1.66m ² : 3000mg/日 1.66m ² ≤ BSA < 1.96m ² : 3600mg/日 1.96m ² ≤ : 4200mg/日 | 内服 | | | | ○ 夕食後 から | → 連日 | ○ 朝食後 まで | |
|----------------------------------|--|----|--|--|--|----------------|---------|----------------|--|