

レジメン名称: CapeOX+Nivolumab療法(血管痛対策②DEX分割+5%ブドウ糖500mL)

外科・胃癌-1-1-25

診療科 : 外科
 適応症 : 切除不能進行・再発胃がん
 1コース : 21日間

総コース数 : PDとなるまで

引用文献:

RP	医薬品名(商品名)・(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	day(1)		day(15)	備考
1	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL アロカリス点滴静注(235mg/10mL) デキサート注射液(3.3mg/1mL)	50mL 10mL 1mL	点滴末梢	メイン	30分	○			
2	生理食塩液[100mL/瓶] オブジーボ点滴静注	100 mL 360mg/body	点滴末梢 (フィルター使用)	メイン	30分	○			
3	5%ブドウ糖液[50mL/瓶]	50 mL	点滴末梢	メイン	フラッシュ	○			
4	5%ブドウ糖液[500mL/瓶] オキサリプラチン点滴静注液 デキサート注射液(3.3mg/1mL)	500 mL 130mg/m ² 1mL	点滴末梢	メイン	120分	○			
5	生理食塩液[50mL/瓶]	50mL	点滴末梢	メイン	フラッシュ	○			

	カペシタビン錠 1日2回朝・夕食後 14日間内服7日間休薬	BSA<1.36m ² : 2400mg/日 1.36m ² ≤ BSA < 1.66m ² : 3000mg/日 1.66m ² ≤ BSA < 1.96m ² : 3600mg/日 1.96m ² ≤ : 4200mg/日	内服			○ 夕食後 から	→ 連日	○ 朝食後 まで	
--	----------------------------------	--	----	--	--	----------------	---------	----------------	--