

レジメン名称: ゾルベツキシマブ＋CapeOX療法(血管痛対策)

外科・胃癌－1-1-30

診療科 : 外科

適応症 : CLDN18.2陽性の治癒切除不能な進行・再発の胃癌

1コース : 21日間

総コース数 : PDとなるまで

| RP | 医薬品名(商品名)・(規格)                                                                                                      | 投与量                                                                                                                                                                                          | 手技                | ルート | 投与時間          | day(1)         |         | day(15)        | 備考 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|---------------|----------------|---------|----------------|----|
| 1  | パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL<br>アロカリス点滴静注(235mg/10mL)<br>デキサート注射液(6.6mg/2mL)<br>デキサート注射液(3.3mg/1mL)<br>ポララミン注(5mg/1mL) | 50mL<br>10mL<br>2mL<br>1mL<br>1mL                                                                                                                                                            | 点滴末梢              | メイン | 30分           | ○              |         |                |    |
| 2  | 生理食塩液〔50mL/瓶〕                                                                                                       | 50mL                                                                                                                                                                                         | 点滴末梢              | メイン | フラッシュ         | ○              |         |                |    |
| 3  | 生理食塩液〔500mL/瓶〕<br>ビロイ点滴静注用<br>注射用水(20mL/菅)<br>* 2mg/mLになるように生理食塩液を調製                                                | 初回: 800mg/m <sup>2</sup><br>2回目以降: 600mg/m <sup>2</sup><br>40mL                                                                                                                              | 点滴末梢<br>(フィルター使用) | メイン | 点滴速度<br>換算表参照 | ○              |         |                |    |
| 4  | 生理食塩液〔50mL/瓶〕                                                                                                       | 50mL                                                                                                                                                                                         | 点滴末梢              | メイン | フラッシュ         | ○              |         |                |    |
| 5  | 5%ブドウ糖液〔500mL/瓶〕<br>オキサリプラチン点滴静注液                                                                                   | 500 mL<br>130mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                               | 点滴末梢              | メイン | 120分          | ○              |         |                |    |
| 6  | 生理食塩液〔50mL/瓶〕                                                                                                       | 50mL                                                                                                                                                                                         | 点滴末梢              | メイン | フラッシュ         | ○              |         |                |    |
|    | カペシタビン錠<br>1日2回朝・夕食後 14日間内服7日間休薬                                                                                    | BSA<1.36m <sup>2</sup> : 2400mg/日<br>1.36m <sup>2</sup> ≤BSA<1.66m <sup>2</sup> :<br>3000mg/日<br>1.66m <sup>2</sup> ≤BSA<1.96m <sup>2</sup> :<br>3600mg/日<br>1.96m <sup>2</sup> ≤ : 4200mg/日 | 内服                |     |               | ○<br>夕食後<br>から | →<br>連日 | ○<br>朝食後<br>まで |    |