

レジメン名称: Pembrolizumab+Tmab+SOX療法【1クール目】

外科・胃癌-1-1-32

診療科 : 外科

適応症 : 化学療法歴のないHER2陽性の治癒切除不能な進行・再発の胃がん

1コース : 21日間

総コース数 : PDとなるまで

引用文献 :

RP	薬品名(商品名)(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	day(1)	~	day(15)	備考
1	生理食塩液[50mL/瓶]	50mL	点滴末梢	メイン	キープ	○			
2	生理食塩液[100mL/瓶] キイトルーダ点滴静注	100 mL 200mg/body	点滴末梢 (フィルター使用)	メイン	30分	○			
3	生理食塩液[50mL/瓶]	50mL	点滴末梢	メイン	フラッシュ	○			
4	生理食塩液[250mL/瓶] 注射用水(溶解用) トラスツズマブBS点滴静注用	250 mL 40mL 8mg/kg	点滴末梢	メイン	90分	○			
5	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL アロカリス点滴静注(235mg/10mL) デキサート注射液(6.6mg/2mL)	50mL 10mL 6.6mg	点滴末梢	メイン	30分	○			
6	5%ブドウ糖液[250mL/瓶] オキサリプラチン点滴静注液	250 mL 100mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢	メイン	120分	○			
7	生理食塩液[50mL/瓶]	50mL	点滴末梢	メイン	フラッシュ	○			

S-1配合OD錠 1日2回 朝・夕食後 14日間内服、7日間休薬	BSA<1.25m <sup>2</sup> 80mg/day 1.25≦BSA<1.5m <sup>2</sup> 100mg/day 1.5m <sup>2</sup> ≦BSA 120mg/day	内服	○ 夕食後 から開始	→ 日	連 ○ 朝食後 まで	
-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------------------	--------	---------------------	--