

レジメン名称 : Pembrolizumab + Tmab + SOX療法【2クール目以降】

外科・胃癌-1-1-32

診療科 : 外科

適応症 : 化学療法歴のないHER2陽性の治癒切除不能な進行・再発の胃癌

1コース : 21日間

総コース数 : PDとなるまで

引用文献 :

RP	薬品名(商品名)(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	day(1)	~	day(15)	備考
1	生理食塩液〔50mL/瓶〕	50mL	点滴末梢	メイン	キープ	○			
2	生理食塩液〔100mL/瓶〕 キイトルーダ点滴静注	100 mL 200mg/body	点滴末梢 (フィルター使用)	メイン	30分	○			
3	生理食塩液〔50mL/瓶〕	50mL	点滴末梢	メイン	フラッシュ	○			
4	生理食塩液〔250mL/瓶〕 注射用水(溶解用) トラスツズマブBS点滴静注用	250 mL 40mL 6mg/kg	点滴末梢	メイン	30分	○			
5	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL アロカリス点滴静注(235mg/10mL) デキサート注射液(6.6mg/2mL)	50mL 10mL 6.6mg	点滴末梢	メイン	30分	○			
6	5%ブドウ糖液〔250mL/瓶〕 オキサリプラチン点滴静注液	250 mL 100mg/m ²	点滴末梢	メイン	120分	○			
7	生理食塩液〔50mL/瓶〕	50mL	点滴末梢	メイン	フラッシュ	○			
	S-1配合OD錠 1日2回 朝・夕食後 14日間内服、7日間休薬	BSA < 1.25m ² 80mg/day 1.25 ≤ BSA < 1.5m ² 100mg/day 1.5m ² ≤ BSA 120mg/day		内服		○ 夕食後 から開始	→ 連日	○ 朝食後 まで	