

レジメン名称 : Pembrolizumab + Tmab + CapeOX療法【1クール目】

外科・胃癌-1-1-33

診療科 : 外科

適応症 : 化学療法歴のないHER2陽性の治癒切除不能な進行・再発の胃がん

1コース : 21日間

総コース数 : PDとなるまで

引用文献 :

RP	薬品名(商品名)(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	day(1)	~	day(15)	備考
1	生理食塩液〔50mL/瓶〕	50mL	点滴末梢	メイン	キープ	○			
2	生理食塩液〔100mL/瓶〕 キイトルーダ点滴静注	100 mL 200mg/body	点滴末梢 (フィルター使用)	メイン	30分	○			
3	生理食塩液〔50mL/瓶〕	50mL	点滴末梢	メイン	フラッシュ	○			
4	生理食塩液〔250mL/瓶〕 注射用水(溶解用) トラスツズマブBS点滴静注用	250 mL 40mL 8mg/kg	点滴末梢	メイン	90分	○			
5	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL アロカリス点滴静注(235mg/10mL) デキサート注射液(6.6mg/2mL)	50mL 10mL 6.6mg	点滴末梢	メイン	30分	○			
6	5%ブドウ糖液〔250mL/瓶〕 オキサリプラチン点滴静注液	250 mL 130mg/m ²	点滴末梢	メイン	120分	○			
7	生理食塩液〔50mL/瓶〕	50mL	点滴末梢	メイン	フラッシュ	○			
	カペシタビン錠 1日2回朝・夕食後 14日間内服7日間休薬	BSA<1.36m ² : 2400mg/日 1.36m ² ≤BSA<1.66m ² : 3000mg/日 1.66m ² ≤BSA<1.96m ² : 3600mg/日 1.96m ² ≤ : 4200mg/日	内服			○ 夕食後 から	→ 連日	○ 朝食後 まで	