

レジメン名称: SOX+Nivolumab療法(血管痛対策)

消化器内科・胃がんー2-3-03

診療科 : 消化器内科
 適応症 : 切除不能進行・再発胃がん
 1コース : 21日間

総コース数 : PDとなるまで

引用文献:

RP	医薬品名(商品名)・(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	day(1)		day(15)	備考
1	パロノセトン点滴静注バッグ0.75mg/50mL アロカリス点滴静注235mg デキサート注射液(3.3mg/1mL)	50 mL 10mL 1mL	点滴末梢	メイン	30分	○			
2	生理食塩液〔100mL/瓶〕 オプジーボ点滴静注	100 mL 360mg/body	点滴末梢 (フィルター使用)	メイン	30分	○			
3	5%ブドウ糖液〔50mL/瓶〕	50 mL	点滴末梢	メイン	フラッシュ	○			
4	5%ブドウ糖液〔500mL/瓶〕 オキサリプラチン点滴静注液 デキサート注射液(3.3mg/1mL)	500 mL 100mg/m ² 1mL	点滴末梢	メイン	120分	○			
5	生理食塩液〔50mL/瓶〕	50mL	点滴末梢	メイン	フラッシュ	○			
	S-1配合OD錠 1日2回 朝・夕食後 14日間内服、7日間休薬	BSA<1.25m ² 80mg/day 1.25≤BSA<1.5m ² 100mg/day 1.5m ² ≤BSA 120mg/day	内服			○ 夕食後 から	→ 連日	○ 朝食後 まで	