

レジメン名称: SOX+Nivolumab療法(血管痛対策②)DEX分割+5%ブドウ糖500m 消化器内科・胃がん-2-3-03

診療科 : 消化器内科  
 適応症 : 切除不能進行・再発胃がん  
 1コース : 21日間

総コース数 : PDとなるまで

引用文献:

| RP | 医薬品名(商品名)・(規格)   | 投与量                                   | 手技                | ルート | 投与時間  | day(1) |  | day(15) | 備考 |
|----|--|---------------------------------------|-------------------|-----|-------|--------|--|---------|----|
| 1  | 生理食塩液[100mL/瓶]<br>ホスアプレピタント点滴静注用150mg                    | 100 mL<br>150mg                       | 点滴末梢              | メイン | 30分   | ○      |  |         |    |
| 2  | パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL<br>デキサート注射液(3.3mg/1mL)         | 50 mL<br>1mL                          | 点滴末梢              | メイン | 30分   | ○      |  |         |    |
| 3  | 生理食塩液[100mL/瓶]<br>オプジーボ点滴静注                              | 100 mL<br>360mg/body                  | 点滴末梢<br>(フィルター使用) | メイン | 30分   | ○      |  |         |    |
| 4  | 5%ブドウ糖液[50mL/瓶]  | 50 mL                                 | 点滴末梢              | メイン | フラッシュ | ○      |  |         |    |
| 5  | 5%ブドウ糖液[500mL/瓶]<br>オキサリプラチン点滴静注液<br>デキサート注射液(3.3mg/1mL) | 500 mL<br>130mg/m <sup>2</sup><br>1mL | 点滴末梢              | メイン | 120分  | ○      |  |         |    |
| 6  | 生理食塩液[50mL/瓶]  | 50mL                                  | 点滴末梢              | メイン | フラッシュ | ○      |  |         |    |

|  |   |    |  |  |  |                |         |                |  |
|--|---|----|--|--|--|----------------|---------|----------------|--|
| エヌケーエスワン配合OD錠<br>1日2回 朝・夕食後 14日間内服、7日間休薬 | BSA<1.25m <sup>2</sup> 80mg/day<br>1.25≤BSA<1.5m <sup>2</sup> 100mg/day<br>1.5m <sup>2</sup> ≤BSA 120mg/day | 内服 |  |  |  | ○<br>夕食後<br>から | →<br>連日 | ○<br>朝食後<br>まで |  |
|--|---|----|--|--|--|----------------|---------|----------------|--|