

レジメン名称 : CapeOX+Nivolumab療法

消化器内科・胃がん-2-3-04

診療科 : 消化器内科  
 適応症 : 切除不能進行・再発胃がん  
 1コース : 21日間

総コース数 : PDとなるまで

引用文献:

| RP | 医薬品名(商品名)・(規格)                                   | 投与量                            | 手技                | ルート | 投与時間  | day(1) |  | day(15) | 備考 |
|----|--|--------------------------------|-------------------|-----|-------|--------|--|---------|----|
| 1  | 生理食塩液[100mL/瓶]<br>ホスアプレピタント点滴静注用150mg            | 100 mL<br>150mg                | 点滴末梢              | メイン | 30分   | ○      |  |         |    |
| 2  | パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL<br>デキサート注射液(6.6mg/2mL) | 50 mL<br>6.6mg                 | 点滴末梢              | メイン | 30分   | ○      |  |         |    |
| 3  | 生理食塩液[100mL/瓶]<br>オブジーボ点滴静注                      | 100 mL<br>360mg/body           | 点滴末梢<br>(フィルター使用) | メイン | 30分   | ○      |  |         |    |
| 4  | 5%ブドウ糖液[50mL/瓶]                                  | 50 mL                          | 点滴末梢              | メイン | フラッシュ | ○      |  |         |    |
| 5  | 5%ブドウ糖液[250mL/瓶]<br>オキサリプラチン点滴静注液                | 250 mL<br>130mg/m <sup>2</sup> | 点滴末梢              | メイン | 120分  | ○      |  |         |    |
| 6  | 生理食塩液[50mL/瓶]                                    | 50mL                           | 点滴末梢              | メイン | フラッシュ | ○      |  |         |    |

|                                  |  |    |  |  |  |                |         |                |  |
|----------------------------------|--|----|--|--|--|----------------|---------|----------------|--|
| カペシタビン錠<br>1日2回朝・夕食後 14日間内服7日間休薬 | BSA<1.36m <sup>2</sup> : 2400mg/日<br>1.36m <sup>2</sup> ≤ BSA<1.66m <sup>2</sup> : 3000mg/日<br>1.66m <sup>2</sup> ≤ BSA<1.96m <sup>2</sup> : 3600mg/日<br>1.96m <sup>2</sup> ≤ : 4200mg/日 | 内服 |  |  |  | ○<br>夕食後<br>から | →<br>連日 | ○<br>朝食後<br>まで |  |
|----------------------------------|--|----|--|--|--|----------------|---------|----------------|--|