

レジメン名称:オニバイド(イリノテカン リポソーム)+5-FU+LV(ポンプ) 消化器内科・膵がんー2-1-07

診療科 : 消化器内科
 適応症 : 切除不能進行・再発膵がん
 1コース : 14日間 総コース数 :

引用文献:

RP	医薬品名(商品名)・(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	day(1)	day(3)	備考
1	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL デキサート注射液(6.6mg/2mL) デキサート注射液(3.3mg/1mL)	50 mL 6.6mg 3.3mg	点滴中心静脈 (フィルター使用)	メイン	30分	○		
2	5%ブドウ糖液[50mL/瓶]	50mL	点滴中心静脈 (フィルター禁止)	メイン	オニバイドルート プライミング用	○		
3	5%ブドウ糖液[500mL/瓶] オニバイド点滴静注	500 mL 70mg/m ²	点滴中心静脈 (フィルター禁止)	メイン	90分	○		
4	5%ブドウ糖液[250mL/瓶] レボホリナート点滴静注用	250 mL 200mg/m ²	点滴中心静脈 (フィルター使用)	メイン	120分	○		
5	生理食塩液[50mL/瓶] フルオロウラシル注	全量110mL 2400mg/m ²	ポンプ	メイン	2. 5mL/h (44時間)	○		
6	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ [10mL/本]	10mL	点滴中心静脈 (フィルター使用)	メイン	フラッシュ		○	