

レジメン名称: GCS(GEM+CDDP+S-1)療法

消化器内科・胆道がん-2-2-06

診療科 : 消化器内科

適応症 : 切除不能進行・再発胆道がん

1コース : 14日間

総コース数 : PDとなるまで

引用文献:

RP	医薬品名(商品名)・(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	day(1)	day(8)	備考
1	ソルデム3A輸液[500mL/袋] 硫酸Mg補正液[1mEq/mL]	500mL 8mL	点滴末梢 中心静脈	メイン	60分	○		
2	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL デキサート注射液(6.6mg/2mL)	50 mL 6.6mg	点滴末梢 中心静脈	メイン	15分	○		
3	生理食塩液[500mL/袋]	500mL	点滴末梢 中心静脈	メイン	60分	○		
4	生理食塩液[250mL/袋] シスプラチン	250mL 25mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢 中心静脈	メイン	60分	○		
5	生理食塩液[100mL/瓶] ゲムシタピン点滴静注液	全量100 mL 1000mg/m <sup>2</sup>	点滴末梢 中心静脈	メイン	30分	○		
6	生理食塩液[50mL/瓶]	50 mL	点滴末梢 中心静脈	メイン	フラッシュ	○		

S-1・OD錠 1日2回 朝・夕食後 7日間内服、7日間休薬	内服	BSA 1.25m <sup>2</sup> 未満 : 80mg/日 1.25m <sup>2</sup> 以上1.5m <sup>2</sup> 未満 : 100mg/日 1.5m <sup>2</sup> 以上 : 120mg/日	○ 夕食後か ら開始	○ 朝食後 まで	
-----------------------------------	----	--	------------------	----------------	--