

レジメン名称: GEM+CBDCA療法

泌尿器科・尿路上皮がん4-1-02

診療科 : 泌尿器科

適応症 : 尿路上皮癌(膀胱がん、尿管がん、腎盂がん)

1コース : 21日間

総コース数 : PDとなるまで

引用文献:

| RP | 医薬品名(商品名)・(規格) | 投与量 | 手技 | ルート | 投与時間 | day(1) | day(8) | 備考 |
|----|---|-----------------------------------|------|-----|-------|--------|--------|----|
| 1 | パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL アロカリス点滴静注235mg デキサート注射液(6.6mg/2mL) ポララミン注(5mg/1mL) | 50 mL 10mL 2mL 1mL | 点滴末梢 | メイン | 30分 | ○ | / | |
| 2 | 生理食塩液[50mL/瓶] | 50 mL | 点滴末梢 | メイン | キープ | / | ○ | |
| 3 | 生理食塩液[100mL/瓶] ゲムシタピン点滴静注液 | 全量100 mL 1000mg/m ² | 点滴末梢 | メイン | 30分 | ○ | ○ | |
| 4 | 生理食塩液[250mL/袋] カルボプラチン点滴静注液 | 250 mL AUC5 | 点滴末梢 | メイン | 60分 | ○ | / | |
| 5 | 生理食塩液[50mL/瓶] | 50 mL | 点滴末梢 | メイン | フラッシュ | ○ | ○ | |