

泌尿器科・尿路上皮がん4-1-10

レジメン名称 : pembrolizumab＋エンホルツマブ・ベドチン(パドセブ)療法

診療科 : 泌尿器科

適応症 : 根治切除不能な尿路上皮がん(1次治療)

1コース : 21日間

総コース数 : PDとなるまで

引用文献:

| RP | 医薬品名(商品名)・(規格)                            | 投与量                       | 手技                | ルート | 投与時間              | day(1) | day(8) | 備考                     |
|----|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|--------|--------|------------------------|
| 1  | 生理食塩液〔100mL/瓶〕<br>デキサート注射液(6.6mg/2mL)     | 100 mL<br>6.6mg           | 点滴末梢              | メイン | 30分               | ○      | ○      |                        |
| 2  | 生理食塩液〔50mL/瓶〕<br>注射用水〔20mL/A〕<br>パドセブ点滴静注 | 50mL<br>20mL<br>1.25mg/kg | 点滴末梢              | メイン | 30分               | ○      | ○      | 1回上限:125mg             |
| 3  | 生理食塩液〔50mL/瓶〕                             | 50 mL                     | 点滴末梢              | メイン | 初回30分<br>2回目以降15分 | ○      | ○      | 2クール目以降は<br>day8フラッシュ可 |
| 4  | 生理食塩液〔100mL/瓶〕<br>キイトルーダ点滴静注              | 100 mL<br>200mg/body      | 点滴末梢<br>(フィルター使用) | メイン | 30分               | ○      |        |                        |
| 5  | 生理食塩液〔50mL/瓶〕                             | 50 mL                     | 点滴末梢              | メイン | フラッシュ             | ○      |        |                        |