

泌尿器科・尿路上皮がん4-1-11

レジメン名称 : Pembrolizumab + エンホルツマブ・ベドチン(パドセブ)療法

診療科 : 泌尿器科

適応症 : 根治切除不能な尿路上皮がん(1次治療)

1コース : 21日間

総コース数 : PDとなるまで

引用文献:

RP	医薬品名(商品名)・(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	day(1)	day(8)	備考
1	生理食塩液〔100mL/瓶〕 デキサート注射液(6.6mg/2mL)	100 mL 6.6mg	点滴末梢	メイン	30分	○	○	
2	生理食塩液〔50mL/瓶〕 注射用水〔20mL/A〕 パドセブ点滴静注	50mL 20mL 1.25mg/kg	点滴末梢	メイン	30分	○	○	1回上限: 125mg
3	生理食塩液〔50mL/瓶〕	50 mL	点滴末梢	メイン	初回30分 2回目以降15分	○	○	2クール目以降は day8フラッシュ可
4	生理食塩液〔100mL/瓶〕 キイトルーダ点滴静注	100 mL 200mg/body	点滴末梢 (フィルター使用)	メイン	30分	○		
5	生理食塩液〔50mL/瓶〕	50 mL	点滴末梢	メイン	フラッシュ	○		