

レジメン名称:カバジタキセル療法

泌尿器科・前立腺がん4-2-02

診療科 : 泌尿器科
 適応症 : 前立腺がん
 1コース : 21日間

総コース数 : PDとなるまで

引用文献:

RP	医薬品名(商品名)・(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	day(1)	day(2)	備考
1	5%ブドウ糖液[250mL/瓶]	250 mL	点滴末梢 (フィルター使	メイン	60分	○		
1側)	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL デキサート注射液(6.6mg/2mL) ネオレスタール注射液(10mg/1mL) ガスター注射液(20mg/2mL)	50 mL 6.6mg 10mg 20mg	点滴末梢	側管	30分	○		
2	5%ブドウ糖液[250mL/袋] ジェブタナ点滴静注	250 mL 25mg/m ²	点滴末梢 (フィルター使用)	メイン	60分	○		
3	生理食塩液[50mL/瓶]	50 mL	点滴末梢 (フィルター使用)	メイン	フラッシュ	○		
	ジーラスタ皮下注[50mL/瓶]	1筒	皮下注				○	

	プレドニゾロン錠 5mg 1回1錠 1日2回 朝・昼食後 ジェブタナ点滴静注当日～連日内服	1日2錠(10mg)	内服		
--	---	------------	----	--	--